

提防中藥中毒

衛生署近日接獲醫院管理局（醫管局）呈報的一宗確診為烏頭類生物鹼中毒個案。病人服用了自行處方中藥材製附子後一小時出現唇周及四肢麻痺、頭暈和噁心的徵狀。他其後入住公立醫院接受治療，並已出院。醫管局的化驗結果顯示，病人的尿液樣本含有烏頭類生物鹼。

製附子屬於《中醫藥條例》(第549章)附表2內中藥材，一般用於治療痛症，但含有烏頭類生物鹼。如不適當地使用，烏頭類生物鹼可引致唇周和四肢麻痺、頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉、脈搏微弱及呼吸困難，嚴重者可導致死亡。因此，製附子須經長時間的煎煮以降低毒性方可服用。

衛生署提醒市民應向有信譽和合資格的中醫師求診，並應到可靠的零售商購買中藥。市民不可妄自購藥或自行處方中藥服用。為保障健康，切勿購買或服食任何來歷不明的中藥。

衛生署製作了有關安全使用中藥的小冊子作公眾教育，市民可瀏覽中醫藥事務部網頁 (http://cmd.gov.hk/html/b5/health_info/pamphlet.html)，參閱更多健康資訊。

衛生署中醫藥事務部

2014年4月25日